

Pracownia Endoskopowa Przewodu Pokarmowego

tel. 574-404-945

(jeśli z jakichkolwiek przyczyn rezygnują Państwo z udziału w badaniu, prosimy niezwłoczny kontakt w celu odwołania wizyt pn.wt.śr.pt od 9.00 – 13.00)

Termin badania: (uprzejmie informujemy, że wskazana godzina ma charakter orientacyjny i nie stanowi gwarancji rozpoczęcia badania o tej porze. Dokładny czas rozpoczęcia może ulec zmianie w zależności od przebiegu wcześniejszych badań)

Przygotowanie preparatem FORTRANS (recepta od lekarza pierwszego kontaktu)

DIETA		Zastosowanie Fortransu
4 dni przed terminem badania	NIE SPOŻYWAĆ - pieczywa z ziarnami, owoców pestkowych (winogrono, pomidor, kiwi, truskawki), nasion siemienia lnianego, maku, sezamu, - warzyw barwiących typu buraki	Bez Fortransu
2 dni przed terminem badania	NIE SPOŻYWAĆ - tłustego mięsa i wędlin, surowych warzyw i owoców, - produktów powodujących rozdymanie (fasola, groch), - różnego rodzaju kaszy, - ciemnego pieczywa MOŻNA SPOŻYWAĆ: - białe pieczywo, - chudą wędlinę oraz jajka, - gotowane mięso ryb lub kurczaka, - ryż, drobny makaron gotowane ziemniaki, - zmiksowane zupy, - można spożywać kawę, herbatę oraz klarowne soki (bez zawiesiny), wodę mineralną niegazowaną	Bez Fortransu

DIETA		Zastosowanie Fortransu
1 dzień przed terminem badania	<p>ok. godziny 8.00 lekkostrawne śniadanie: białe pieczywo, jajko, chuda wędlina, kawa, herbata, klarowne soki, woda mineralna niegazowana</p> <p>ok. godziny 15:00 kisiel lub galaretka bez owoców</p> <p>po godzinie 15:00 można ssać landrynki, pić dużą ilość wody niegazowanej</p> <p>DO CZASU BADANIA NIE ZALEŻY SPOŻYWAĆ POKARMÓW</p>	<p>Zastosowanie preparatu Fortrans zależne jest od planowanej godziny badania</p> <p>Godzina planowanej koloskopii</p> <p>Badanie w godzinach 7:00- 11:30</p> <p>W dniu przed badaniem należy spożyć 3 saszetki Fortrans rozpuszczone (każda rozpuszczona w 1 litrze wody niegazowanej). Spożywanie preparatu należy rozpocząć od godziny 16:00 pijąc co 15 minut szklankę przygotowanego roztworu. Dodatkowo po spożyciu zaleca się spożycie 2 litrów wody niegazowanej.</p> <p>W dzień badania o godzinie 5:30 przygotować ostatnią saszetkę Fortransu w 1 litrze wody i bezzwłocznie rozpocząć spożywanie preparatu pijąc 1 szklankę co 15 minut</p> <p>Badanie w godzinach 12:00- 15:00</p> <p>W dniu przed badaniem należy spożyć 2 saszetki Fortransu rozpuszczone każda rozpuszczona w 1 litrze wody niegazowanej). Spożywanie preparatu powinno odbyć się w godzinach 19:00- 21:00 pijąc 1 szklankę zawiesiny co 15 minut dodatkowo po spożyciu zaleca się spożycie 2 litrów wody niegazowanej.</p> <p>W dzień badanie od godziny 5:00 do 7:00 należy rozpuścić kolejno 2 saszetki preparatu i bezzwłocznie rozpocząć ich spożycie pijąc 1 szklane co 15 minut</p> <p>Badanie po godzinie 15:00</p> <p>Przygotowanie do badania rozpoczyna się w dzień badania rozpuszczając 4 saszetki preparatu (każdą rozpuszczona w 1 litrze wody). Spożywanie preparatu należy rozpocząć od godziny 5.00, pijąc 1 szklanego zawiesiny co 15 minut.</p>
Dzień badania	<p>Do dwóch godzin przed badaniem można pić dowolną ilość wody niegazowanej oraz w przypadku osób chorujących na cukrzycę ssać landrynki</p> <p>DO CZASU WYKONANIA BADANIA NIE NALEŻY SPOŻYWAĆ ŻADNYCH POKARAMÓW</p>	

*Pacjenci, którzy przyjmują leki wpływające na krzepliwość krwi, powinni kilka dni przed badaniem je odstawić lub zamienić na inne. Należy to zrobić po konsultacji z lekarzem.